

**COMPOSITIO CUM CYTOKINAE et SNA®-TNM Ref 2LTNM 1507 CH 192 F1**

Composition pour une séquence de 5 gélules: - samenstelling voor elke serie van 5 capsules: - Zusammensetzung je Sequenz von 5 Kapseln: - composición para una secuencia de 5 cápsulas: - composition for one sequence of 5 capsules:

Interleukin 6 (IL-6): 27 CH; Interleukin 12 (IL-12): 4 CH; Interferon alpha (IFN-α): 3 CH; Ribonucleicum Acidum (ARN/RNA): 6-12-30-200 K; Ciliary Neuro Tropic Factor (CNTF): 27 CH; Desoxyribonucleicum Acidum (ADN/DNA): 6-12-30-200 K; Epidermal Growth Factor (EGF): 27 CH; Insulin Growth Factor 1 (IGF-1): 27 CH; Angiogenin: 27 CH; Platelet Derived Endothelial Cell Growth Factor (PD-ECGF): 7 CH; Somatostatin (SS): 27 CH; Transforming Growth Factor beta (TGF-β): 27 CH; Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α): 7 CH; Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF): 27 CH; Leukemia Inhibitory Factor (LIF): 9 CH; Acid. Nucleic. Specif. SNA®-TNMa-01: 18 CH; Acid. Nucleic. Specif. SNA®-TNMb-01: 18 CH; Acid. Nucleic. Specif. SNA®-TNMc-01: 18 CH; Acid. Nucleic. Specif. SNA®-HLA I: 18 CH; Acid. Nucleic. Specif. SNA®-HLA II: 18 CH; Excip. Saccharos.

Fabriqué par / Gefabriceerd door / Hergestellt durch / Fabricado por / Manufactured by : LABO'LIFE ESPAÑA

Distribué par / Verdeeld door / Vertrieben durch / Distribuido por / Distributed by : LABO'LIFE Belgium

**FR****Médicament homéopathique**

**PRÉSENTATION** : Boîte de 30 gélules, 3 plaquettes de 10 gélules.

**FORME PHARMACEUTIQUE** : Granules en gélules à ouvrir.

**POSOLOGIE** : La dose recommandée est d'une gélule par jour. Cette posologie peut être modifiée et adaptée par votre médecin ou pharmacien en fonction de votre état de santé.

**MODE D'ADMINISTRATION** : Il est recommandé de prendre ce médicament en respectant un intervalle d'au moins 15 à 30 minutes avant ou 1 heure après l'ingestion d'aliments/de boissons ou l'utilisation de produits à base de menthe. En cas de prescription de plusieurs gélules par jour, répartir les prises au cours de la journée, en dehors des repas et en respectant un intervalle d'au moins 2 heures entre chaque prise.

Commencez par la gélule 1 et suivez ensuite l'ordre numérique (gélule 2, 3...). Il ne faut pas avaler la gélule entière. Ouvrez la gélule, versez son contenu (granules) sous la langue et laissez fondre. A la fin de la première plaquette, continuez avec la gélule 1 de la plaquette suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boîte.

**CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : Ne prenez jamais ce médicament si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ce médicament contient du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

**MISE EN GARDE** : Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou de votre pharmacien.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES** : Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour. Éviter tout médicament à base de menthe, dans l'heure qui précède la prise du médicament.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT** : Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS** : Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. De façon exceptionnelle, il peut apparaître une dyspepsie (troubles digestifs) lors des prises à jeun. Dans ce cas, la prise des granules se fera 1 heure après le repas.

**CONDITIONS DE CONSERVATION** : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**DATE DE PÉREMPTION** : N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS, INTERROGEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

**NL****Homeopathisch geneesmiddel**

**AFLEVERINGSVORM**: Doos met 30 capsules, 3 blisterverpakkingen met 10 capsules.

**FARMACEUTISCHE VORM**: Globuli in capsules om te openen.

**DOSERING**: De geadviseerde dosering is één capsule per dag. Deze dosering kan door uw arts of apotheker worden aangepast, afhankelijk van uw gezondheidstoestand.

**GEBRUIKSAANWIJZING**: Dit geneesmiddel moet worden ingenomen met een tussenpoos van ten minste 15-30 minuten vóór of 1 uur na de inname van voedsel/drank of het gebruik van producten met munt. In het geval van het voorschrijven van meerdere capsules per dag, gelieve de inname over de dag te spreiden, ten minste een half uur voor de maaltijden in te nemen en ten minste 2 uur tussen de innames te laten.

Begin met capsule 1 en volg daarna de numerieke volgorde (capsule 2, 3...). Slik de capsule niet in zijn geheel in. Open de capsule, giet de inhoud (globuli) van de capsule onder de tong en laat smelten. Op het einde van de eerste blisterverpakking gaat u voort met capsule 1 van de volgende blisterverpakking, en zo gaat u door tot de doos leeg is.

**CONTRA-INDICATIES EN VOORZORGSMAT-REGELEN**: Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit medicijn.

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

**WAARSCHUWINGEN**: De behandeling mag niet onderbroken worden zonder de toestemming van uw arts of apotheker.

**INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN**: Er is tot op heden geen interactie met andere geneesmiddelen bekend. Vermijd elk geneesmiddel op basis van munt in het uur vóór de inname van dit middel.

**ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING**: Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

**MOGELIJKE BIJWERKINGEN**: Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. In uitzonderlijke gevallen kan dyspepsie (problemen met de spijsvertering) voorkomen bij inname op een nuchtere maag. Neem in dat geval de globuli 1 uur na de maaltijd.

**VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE BEWA-RING**: Bewaren bij temperatuur beneden 25°C. De geneesmiddelen buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

**UITERSTE GEBRUIKSDATUM**: Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP.

HEEFT U NOG VRAGEN? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER.

**DE****Homöopathisches Arzneimittel**

**INHALT**: Schachtel mit 30 Kapseln, 3 Blisterpackungen zu je 10 Kapseln.

**DARREICHUNGSFORM**: Streukügelchen zur Entnahme aus Kapseln.

**DOSIERUNG**: Die empfohlene Dosis beträgt eine Kapsel pro Tag. Diese Dosis kann von Ihrem Arzt oder Apotheker, je nach Ihrem Gesundheitszustand, geändert und angepasst werden.

**ART DER ANWENDUNG**: Dieses Arzneimittel sollte mit einem Abstand von mind. 15-30 Minuten vor oder 1 Stunde nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln oder Getränken sowie der Anwendung von Minzprodukten verabreicht werden. Bei der Verschreibung mehrerer Kapseln sollten die Einnahmen über den Tag verteilt werden – getrennt von Mahlzeiten und mit einem Abstand von mindestens 2 Stunden zwischen den Einnahmen.

Beginnen Sie mit Kapsel 1 und halten Sie darauf die Nummernfolge (2, 3...) ein. Schlucken Sie nicht die gesamte Kapsel hinunter. Öffnen Sie die Kapsel, geben Sie den Kapselinhalt (Streukügelchen) unter die Zunge und lassen Sie diesen dort zergehen. Wenn die erste Blisterpackung aufgebraucht ist, fahren Sie mit Kapsel 1 der nächsten Blisterpackung fort, bis die Schachtel leer ist.

**GEGENANZEIGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN**: Dieses Arzneimittel darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

**WARNHINWEISE**: Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes oder Apothekers.

**WECHSELWIRKUNGEN**: Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Vermeiden Sie Arzneimittel auf Minzbasis eine Stunde vor der Einnahme des Arzneimittels.

**SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT**: Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN**: Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In Ausnahmefällen kann bei der Einnahme auf nüchternen Magen eine Dyspepsie (Verdauungsstörung) auftreten. In diesem Fall werden die Streukügelchen 1 Stunde nach der Mahlzeit eingenommen.

**HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG**: Nicht über 25°C lagern. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

**VERFALLDATUM**: Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

WENN SIE WEITERE FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

**ES****Medicamento homeopático****PRESENTACIÓN:** Caja de 30 cápsulas, 3 blísters de 10 cápsulas.**FORMA FARMACÉUTICA:** Glóbulos en cápsulas para abrir.**POSOLOGÍA:** La dosis recomendada es una cápsula al día. Esta posología puede ser modificada y adaptada por su médico o farmacéutico en función de su estado de salud.**FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Se recomienda tomar este medicamento al menos 15-30 minutos antes o 1 hora después de la ingesta de comida/bebida o del uso de productos a base de menta. En el caso de prescripción de varias cápsulas al día, las tomas se deben espaciar a lo largo del día, alejadas de las comidas y manteniendo un intervalo de mínimo 2 horas entre las tomas.

Tome la cápsula 1 y siga después el orden numérico (cápsula 2, 3...). No se debe tragar la cápsula entera. Abra la cápsula, vierta su contenido (glóbulos) debajo de la lengua y deje que se disuelva. Al finalizar el primer blíster, continúe con la cápsula 1 del blíster siguiente y siga así hasta acabar la caja.

**CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO:** No tome este medicamento si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

**ADVERTENCIAS:** No interrumpir el tratamiento sin consultar a su médico o farmacéutico.**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:** No se han descrito interacciones con otros medicamentos hasta la fecha. Evite cualquier medicamento que contenga menta una hora antes de la toma del medicamento.**EMBARAZO Y LACTANCIA:** Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:** Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. De forma excepcional, puede aparecer dispepsia (trastornos digestivos) durante las tomas en ayunas. En este caso, la administración de los glóbulos se realizará 1 hora después de la comida.**CONSERVACIÓN:** No conservar a temperatura superior a 25°C. Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.**FECHA DE CADUCIDAD:** No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de EXP.

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.

**EN****Homeopathic medicine****PRESENTATION:** Box of 30 capsules, 3 blisters of 10 capsules.**PHARMACEUTICAL FORM:** Pillules in capsules for opening.**POSODOLOGY:** The recommended dosage is one capsule per day. This dosage can be modified and adapted by your doctor or pharmacist depending on your health condition.**METHOD OF ADMINISTRATION:** This medicine should be taken leaving a gap of at least 15-30 minutes before or 1 hour after food/drink intake or the use of products with mint. In case of prescription of several capsules per day, please space out the intakes throughout the day, away from meals and leaving at least 2 hours between the intakes.


Take capsule 1 and respect afterwards the numerical order (capsule 2, 3...). The whole capsule should not be swallowed. Open the capsule, pour the content (pillules) under the tongue, and allow to melt. At the end of the first blister, keep on with capsule 1 of the next blister, and so forth until the box is empty.

**CONTRAINDICATIONS AND PRECAUTIONS FOR USE:** Do not take this medicine if you are allergic to the active substances or any of the other ingredients of this medicine.


This medicine contains sucrose. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

**WARNING:** Do not interrupt treatment without the agreement of your doctor or pharmacist.**INTERACTION WITH OTHER MEDICINAL PRODUCTS:** No interaction with any other medicines is known to date. Avoid any medicine with mint, within the hour preceding the medicine intake.**PREGNANCY AND BREAST-FEEDING:** If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.**POSSIBLE SIDE EFFECTS:** Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Exceptionally, dyspepsia (digestive disorders) may occur when taken on an empty stomach. In this case, the pillules will be taken 1 hour after the meal.**STORAGE CONDITIONS:** Do not store above 25°C. Keep this medicine out of the sight and reach of children.**EXPIRY DATE:** Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the packaging after EXP.


IF YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS, ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.




- Sortez une des trois plaquettes de la boîte.
- Neem één van de drie blisterverpakkingen uit de doos.
- Nehmen Sie eine der drei Blisterpackungen aus der Schachtel.
- Empiece con uno de los tres blísters de la caja.
- Take one of the three blisters out of the box.



- Prenez une gélule en suivant la numérotation.
- Neem een capsule volgens de nummering.
- Entnehmen Sie eine Kapsel unter Einhaltung der Nummernfolge.
- Tome una cápsula siguiendo el orden numérico.
- Take one capsule respecting the numerical order.



- Ouvrez la gélule avec soin en soulevant la tête (\*).
- Open de capsule voorzichtig door de bovenste helft opwaarts te trekken (\*).
- Öffnen Sie vorsichtig die Kapsel, indem Sie den oberen Teil anheben (\*).
- Abra la cápsula cuidadosamente, con la cabeza de la cápsula hacia arriba (\*).
- Carefully open the capsule by pulling its head (\*).



- Versez le contenu de la gélule (granules) sous la langue et laissez fondre.
- Giet de inhoud van de capsule (globuli) onder de tong en laat smelten.
- Geben Sie den Kapselinhalt (Streukügelchen) unter die Zunge und lassen Sie diesen dort zergehen.
- Vierta el contenido de la cápsula (glóbulos) debajo de la lengua y deje que se disuelva.
- Pour the content (pillules) of the capsule under the tongue and allow to melt.

Titulaire / Houder / Inhaber / Titular / Holder :  
**LABO'LIFE Belgium srl, Aut. 1507 H**  
 Av. d'Ecolys 2 bte 36  
 5020 Namur  
 BELGIQUE / BELGIË / BELGIEN / BELGICA / BELGIUM  
 Tél : +32 (0)81/40 87 81 • Fax : +32 (0)81/40 87 89

Fabriqué par / Gefabriceerd door / Hergestellt durch /  
 Fabricado por / Manufactured by :  
**LABO'LIFE ESPAÑA, S.A.U., N° Aut. 3279E**  
 Av. des Raiguers, 7  
 07330 CONSELL  
 ESPAGNE / SPANJE / SPANIEN / ESPAÑA / SPAIN  
 Tel. (34) 971 142035 • Fax (34) 971 622798